



De La Salle University
D A S M A R I Ñ A S

GENERAL SERVICES OFFICE | UNIVERSITY CLINIC



NT_F
COVID-19



PEDIATRIC VACCINATION
FOR AGES 5 TO 11

**MUST
KNOWS FOR
PARENTS /
GUARDIANS**



/officialDOHgov



@DOHgovph



www.doh.gov.ph




DOH Philippines



RESBAKUNA KIDS

ANONG BAKUNA ANG IBIBIGAY SA
MGA BATANG EDAD 5-11 TAONG
GULANG?



Nitong Enero 2022, Pfizer pa lamang ang nabigyan ng Philippine FDA Emergency Use Authorization para sa mga batang edad 5-11 taong gulang.



Batay sa DM 2022-0041



/officialDOHgov



@DOHgovph



www.doh.gov.ph




DOH Philippines



RESBAKUNA KIDS

PAREHO BA ANG BAKUNANG
PFIZER NA UNA NANG IBINIGAY
SA MAS NAKATATANDA?




Bagamat parehong brand (Pfizer), magkaibang timpla ang bakuna na para sa batang edad 5-11 taong gulang at edad 12 taong gulang pataas.

Para siguradong tama ang bakunang ituturok, magkaibang kulay ang takip ng mga botilya ng bakuna.



Batay sa DM 2022-0041





**RESBAKUNA
KIDS**

ANO ANG BENEFISYO NG PAGBABAKUNA?



- *Proteksyon sa pagkaospital at kamatayan dahil sa COVID-19*
- *Proteksyon sa komplikasyon kahit ng banayad na COVID-19 at COVID-19 na walang sintomas (asymptomatic)*
- *Mas ligtas na pagbalik sa paaralan (face-to-face classes) at pagkikita ng pamilya at kaanak*
- *Proteksyon sa mga kabataang hindi pa maaaring bakunahan (edad 4 taon pababa)*

Batay sa DM 2022-0041



/officialDOHgov



@DOHgovph



www.doh.gov.ph




DOH Philippines



RESBAKUNA KIDS

4 / 12

SINO ANG HINDI PA MAAARING BAKUNAHAN?



Hindi pa maaaring mabakunahan ang mga sumusunod:

- Mga batang edad 5-11 na taong gulang na nasa quarantine o isolation pa dahil sa COVID-19.
- Mga sanggol at edad 4 na taong gulang at pababa
- Mga batang may allergy sa anumang sangkap ng bakuna (tulad ng polyethylene glycol o PEG, at polysorbate)


Batay sa DM 2022-0041





RESBAKUNA KIDS

LIGTAS BA ANG BAKUNA PARA SA MGA
BATANG EDAD 5-11 TAONG GULANG NA
MAY KARAMDAMAN (WITH
COMORBIDITIES)?



*Oo, ligtas ang bakuna para sa kanila. Ang mga batang may karamdaman ang **mas nangangailangan ng proteksyong kayang ibigay ng bakuna kontra COVID-19.** Kailangan lamang ng payo ng doktor at medical certificate para sa kanilang karamdaman.*

Batay sa DM 2022-0041





**RESBAKUNA
KIDS**

6 / 12




SINO ANG MAY KAILANGAN NG MEDICAL CERTIFICATE? (1/2)

Ligtas ang bakuna para sa mga may karamdaman, at sila ang mas lalong nangangailangan ng proteksyon mula sa COVID-19 at komplikasyon nito.

1. May **medical complexity**: nakasalalay sa makinarya tulad ng **tracheostomy**; may developmental delay o genetic anomaly
2. May **genetic conditions**: Down Syndrome (Trisomy 21), G6PD, primary immunodeficiency disorders, thalassemia at iba pang chromosomal abnormality
3. May **neurologic conditions**: seizure disorder, autism spectrum disorder, cerebral palsy, stroke in the young, chronic meningitis tulad ng tuberculosis, chronic neuromuscular disease, chronic demyelinating disease
4. May **metabolic/endocrine disease**: diabetes mellitus, diabetes insipidus, hypothyroidism, adrenal insufficiency, hypopituitarism, at iba pang namamanang metabolic disease
5. May **cardiovascular disease (sakit sa puso)**: hypertension, congenital heart disease, cardiomyopathy, rheumatic heart disease, mitral valve disease, pulmonary hypertension with right heart failure
6. **Obese**: BMI > 95th percentile for age and height
7. Na-diagnose ng HIV

Batay sa DM 2022-0041





**RESBAKUNA
KIDS**

7 / 12



SINO ANG MAY KAILANGAN NG MEDICAL CERTIFICATE? (2/2)

8. May **tuberculosis**: pulmonary, extrapulmonary, and disseminated (involvement of 2 or more organs)
9. May **chronic respiratory disease (sakit sa baga)**: chronic lung diseases, congenital respiratory malformation, restrictive lung disease, neuromuscular disorders, syndromic with hypotonia, skeletal disorders, chronic upper and lower airway obstruction (severe obstructive sleep apnea, tracheomalacia, stenosis, bronchial asthma)
10. May **renal disorder (sakit sa bato)**: chronic kidney diseases, nephrotic syndrome, end-stage renal disease (ESRD), pasyenteng kailangan ng dialysis at continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), glomerulonephritis, hydronephrosis
11. May **hepatobiliary disease (sakit sa atay, apdo)**: chronic liver disease, cirrhosis, malabsorption syndrome
12. **Immunocompromised** dahil sa sakit o sa paggagamot: bone marrow or stem cell transplant patients, solid organ transplant recipients, hematological malignancies, cancer patients na may chemotherapy, severe aplastic anemia, autoimmune o autoinflammatory disorder na nagangailangan ng immunosuppressive therapy (systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis), mga ginagamot ng immune-modulating biological therapy (Anti-Tumor Necrosis Factor, rituximab, at iba pa), mga **ginagamot ng systemic steroids nang higit sa isang buwan**, functional asplenia, inoperahan/tinanggalan ng pali (spleen)

Batay sa DM 2022-0041



/officialDOHgov



@DOHgovph



www.doh.gov.ph




DOH Philippines



RESBAKUNA KIDS

DAPAT BA AKONG MANGAMBA SA MGA
“CHISMIS” UKOL SA MRNA VACCINE NA
IBIBIGAY SA 5-11 EDAD, TULAD NG
PFIZER?



Hindi totoong:

- Binabago ang DNA ng nabakunahan
- Naglalaman ng fetal cells, microchip, o animal products
- Naglalaman ng COVID-19 virus
- Naaapektuhan ang fertility

Ligtas at epektibo ang mga bakuna! Huwag maniwala sa mga fake news ukol sa mga bakunang COVID-19 para sa bata.

Batay sa DM 2022-0041



/officialDOHgov



@DOHgovph



www.doh.gov.ph




DOH Philippines



RESBAKUNA KIDS

MAY MGA SERYOSONG REAKSYON
BA NA NAITALA SA BAKUNA?



Sa mga pag-aaral, **bihira ang mga seryosong reaksiyon** at gumaling din ang mga kabataang nagkaroon nito:

- Anaphylaxis (o matinding allergy)
- Myocarditis o pericarditis (pagkamaga ng muscles o talukap ng puso)

Batay sa DM 2022-0041





RESBAKUNA KIDS

ANONG GAGAWIN KUNG MAKARANAS NG SINTOMAS MATAPOS MAGPABAKUNA?



Maaaring magbigay ng paracetamol, kung may lagnat $T > 38C$. Tandaan na ang dosis ng paracetamol ay nakabase sa timbang.

Tawagan ang hotline na ibibigay sa inyo matapos magpabakuna para magkonsulta sa inyong duktur o primary care physician. Kayo ay aabisuhan kung kailangan pumunta sa pinakamalapit na healthcare facility.

Ang mga malubhang reactions ay iimbestigahan ng akmang mga eksperto kung may relasyon sa bakuna o pawang nagkataon lamang.

Batay sa DM 2022-0041



/officialDOHgov



@DOHgovph



www.doh.gov.ph



DOH Philippines




RESBAKUNA KIDS

12 / 12

KAILANGAN PA BA MAGPABAKUNA LABAN SA IBANG SAKIT?



Oo naman! Kailangan pa rin ng bata ng proteksyon laban sa ibang sakit gaya ng:



BAKUNA	SAKIT NA MAIWASAN	DOSING SCHEDULE
Measles-Rubella Vaccine	Tigdas Tigdas-Hangin	1 dose para sa Grade 1 (6-7 taong gulang) 1 dose para sa Grade 7 (12-13 taong gulang)
Tetanus-Diphtheria Vaccine	Tetanus Dipterya	1 dose para sa Grade 1 (6-7 taong gulang) 1 dose for Grade 7 (12-13 taong gulang) na nakakuha na ng 3 doses ng PENTA

Siguraduhin lang na ang pagitan ng bakuna sa COVID-19 at ibang bakuna ay 14 na araw, o maaaring mas maiksi kung pinayuhan ng duktur.

Batay sa DM 2022-0041



/officialDOHgov



@DOHgovph



www.doh.gov.ph



DOH Philippines